

①⑨ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
INSTITUT NATIONAL
DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE
PARIS

①⑪ N° de publication :
(à n'utiliser que pour les
commandes de reproduction)

2 801 207

②① N° d'enregistrement national : **99 14584**

⑤① Int Cl⁷ : A 61 K 7/42, A 61 K 7/02, 7/06

⑫

DEMANDE DE BREVET D'INVENTION

A1

②② Date de dépôt : 19.11.99.

③③ Priorité :

⑦① Demandeur(s) : L'OREAL Société anonyme — FR.

⑦② Inventeur(s) :

④③ Date de mise à la disposition du public de la
demande : 25.05.01 Bulletin 01/21.

⑤⑥ Liste des documents cités dans le rapport de
recherche préliminaire : *Ce dernier n'a pas été
établi à la date de publication de la demande.*

⑥① Références à d'autres documents nationaux
apparentés :

⑦③ Titulaire(s) :

⑦④ Mandataire(s) : L OREAL.

⑤④ COMPOSITIONS FILTRANTES CONTENANT L'ASSOCIATION D'UN DERIVE D'ACIDE NAPHTALENE MONO-
OU POLYCARBOXYLIQUE ET DE L'ACIDE BENZENE 1,4-DI(3-METHYLIDENE-10-CAMPHOSULFONIQUE).

⑤⑦ L'invention concerne des compositions cosmétiques à
usage topique, en particulier pour la photoprotection de la
peau et/ ou des cheveux, caractérisées par le fait qu'elles
comprennent, dans un support cosmétiquement acceptable
notamment de type huile-dans-eau, (a) au moins un dérivé
d'acide naphthalène mono- ou polycarboxylique et (b) au
moins un système photoprotecteur capable de filtrer les
rayons UV contenant au moins l'acide benzène 1, 4-di (3-
méthylidène-10-camphosulfonique), éventuellement sous
forme partiellement ou totalement neutralisée.

L'invention concerne également leur application à la
protection de la peau et des cheveux contre les effets du
rayonnement ultraviolet.

FR 2 801 207 - A1



**COMPOSITIONS FILTRANTES CONTENANT L'ASSOCIATION D'UN DERIVE
D'ACIDE NAPHTALENE MONO- OU POLYCARBOXYLIQUE ET DE L'ACIDE
BENZENE 1,4-DI(3-METHYLIDENE-10-CAMPHOSULFONIQUE),**

5 L'invention concerne des compositions cosmétiques à usage topique, en particulier pour la photoprotection de la peau et/ou des cheveux, caractérisées par le fait qu'elles comprennent, dans un support cosmétiquement acceptable notamment de type huile-dans-eau, (a) au moins un dérivé d'acide naphthalène mono- ou polycarboxylique et (b) au moins un système photoprotecteur capable de filtrer les rayons UV contenant au moins
10 l'acide benzène 1,4-di(3-méthylidène-10-camphosulfonique), éventuellement sous forme partiellement ou totalement neutralisée.

L'invention concerne également leur application à la protection de la peau et des cheveux contre les effets du rayonnement ultraviolet.

15 On sait que les radiations lumineuses de longueurs d'onde comprises entre 280 nm et 400 nm permettent le brunissement de l'épiderme humain et que les rayons de longueurs d'onde comprises entre 280 nm et 320 nm, connus sous la dénomination d'UV-B, provoquent des érythèmes et des brûlures cutanées qui peuvent nuire au développement du bronzage naturel ; ce rayonnement UV-B doit donc être filtré.

On sait également que les rayons UV-A, de longueurs d'onde comprises entre 320 nm et 400 nm, qui provoquent le brunissement de la peau, sont susceptibles d'induire une altération de celle-ci, notamment dans le cas d'une peau sensible ou d'une peau
25 continuellement exposée au rayonnement solaire. Les rayons UV-A provoquent en particulier une perte d'élasticité de la peau et l'apparition de rides conduisant à un vieillissement prématuré. Ils favorisent le déclenchement de la réaction érythémateuse ou amplifient cette réaction chez certains sujets et peuvent même être à l'origine de réactions phototoxiques ou photo-allergiques. Il est donc souhaitable de filtrer aussi le
30 rayonnement UV-A.

De nombreuses compositions cosmétiques destinées à la photoprotection (UV-A et/ou UV-B) de la peau ont été proposées à ce jour.

35 Ces compositions antisolaires se présentent assez souvent sous la forme d'une émulsion de type huile-dans-eau (c'est à dire un support cosmétiquement acceptable constitué d'une phase continue dispersante aqueuse et d'une phase discontinue dispersée huileuse) qui contient, à des concentrations diverses, un ou plusieurs filtres organiques classiques, lipophiles et/ou hydrophiles, capables d'absorber sélectivement les rayonnements UV nocifs, ces filtres (et leurs quantités) étant sélectionnés en fonction du
40 facteur de protection solaire recherché (le facteur de protection solaire (SPF) s'exprimant mathématiquement par le rapport du temps d'irradiation nécessaire pour atteindre le seuil érythématogène avec le filtre UV au temps nécessaire pour atteindre le seuil érythématogène sans filtre UV).

45 La Demanderesse a découvert, de façon inattendue et surprenante, que l'utilisation d'un dérivé d'acide naphthalène mono- ou polycarboxylique dans une composition antisolaires comprenant au moins, comme filtre UV, l'acide benzène 1,4-di(3-méthylidène-10-camphosulfonique), éventuellement sous forme partiellement ou totalement neutralisée, permettait d'augmenter de façon substantielle son niveau de protection vis à vis des effets induits par les radiations UV-A

Cette découverte est à la base de la présente invention.

55

Par système photoprotecteur capable de filtrer les rayons UV, on entend par tout système constitué d'un ou plusieurs composés organiques et/ou composés minéraux filtrant les radiations UV (UVA et/ou UV-B).


- 5 Ainsi, conformément à l'un des objets de la présente invention, il est maintenant proposé de nouvelles compositions cosmétiques ou dermatologiques, en particulier antisolaires, qui sont essentiellement caractérisées par le fait qu'elles comprennent, dans un support cosmétiquement acceptable :
- 10 (a) au moins un dérivé d'acide naphthalène mono- ou polycarboxylique et
(b) au moins un système photoprotecteur capable de filtrer les rayons UV contenant au moins l'acide benzène 1,4-di(3-méthylidène-10-camphosulfonique), éventuellement sous forme partiellement ou totalement neutralisée.

- 15 La présente invention a également pour objet l'utilisation de telles compositions pour la fabrication de compositions cosmétiques destinées à la protection de la peau et/ou des cheveux contre le rayonnement ultraviolet, en particulier le rayonnement solaire.

- 20 La présente invention a également pour objet l'utilisation d'un dérivé d'acide naphthalène mono- ou polycarboxylique dans la préparation d'une composition cosmétique ou dermatologique photoprotectrice comprenant au moins, comme filtre UV organique, l'acide benzène 1,4-di(3-méthylidène-10-camphosulfonique), éventuellement sous forme partiellement ou totalement neutralisée, dans le but d'augmenter son niveau de protection vis à vis des effets induits par les radiations UV-A

- 25 D'autres caractéristiques, aspects et avantages de la présente invention apparaîtront à la lecture de la description détaillée qui va suivre.

- 30 Les dérivés d'acide naphthalène mono- ou poly-carboxylique conformes à l'invention peuvent être choisis parmi les composés comprenant au moins un motif répondant à la structure suivante :



dans laquelle :

- 35 A, identiques ou différents, désignent un groupe OR_1 ; un groupe NR_2R_3 ou un cation M
x est un nombre de 1 à 8 ;
y est un nombre de 0 à 7 avec $x+y \leq 8$;
B, identiques ou différents, désignent hydrogène, OR_1 ; un groupe NR_2R_3 ou un groupe $-(C=O)R_1$;
- 40 R_1, R_2, R_3 , identiques ou différents, désignent hydrogène ; un alkyle en C_1-C_{30} , linéaire ou ramifié acyclique ou cyclique, éventuellement interrompu par un ou plusieurs groupements B différents d'hydrogène ; un alcényle en C_2-C_{30} , linéaire ou ramifié acyclique ou cyclique, éventuellement interrompu par un ou plusieurs hétéroatomes (tels que O, S, N) et
- 45 éventuellement substitué par un ou plusieurs groupements B différents d'hydrogène ; un

- groupement aryle, aralkyle ou alkylaryle en C_6-C_{30} , éventuellement substitué par un ou plusieurs groupements B différents d'hydrogène ; un hétérocycle en C_3-C_{12} , éventuellement substitué par un ou plusieurs groupements B différents d'hydrogène ; un halogène (tel que fluor, brome ou chlore) ; un groupe nitrile ; un groupe amino ; un groupe nitro ; un groupe cyano ; un groupe SO_3H ou SO_3M ; un groupement comportant au moins un atome de silicium ;
- M représente un cation de métal alcalin, de métal alcalino-terreux, un groupe ammonium ou un reste d'amine ou d'alcanolamine quaternisée.

- 10 Parmi les composés de formule (I) connus dans l'art antérieur et utilisables conformément à l'invention, on peut citer :

(1) les acides naphtalène mono- ou polycarboxyliques et leurs sels tels que :

- 15 - l'acide 1-naphtalène carboxylique (disponible chez ALDRICH-catologue 1999-2000) ;
 - l'acide 2-naphtalène carboxylique (disponible chez ALDRICH) ;
 - l'acide 1-hydroxy 2-naphtalène carboxylique (disponible chez ALDRICH) ;
 - l'acide 2-hydroxy 1-naphtalène carboxylique (disponible chez ALDRICH) ;
 - l'acide 3-hydroxy 2-naphtalène carboxylique (disponible chez ALDRICH) ;
 20 - l'acide 6-hydroxy 2-naphtalène carboxylique (disponible chez ALDRICH) ;
 - l'acide 1,4-naphtalène dicarboxylique (disponible chez ALDRICH) ;
 - l'acide 2,3-naphtalène dicarboxylique (disponible chez ALDRICH) ;
 - l'acide 2,6-naphtalène dicarboxylique (disponible chez ALDRICH) ;
 - l'acide 2,6-naphtalène dicarboxylique
 25 - l'acide 1,3-naphtalène dicarboxylique
 - l'acide 1,2-naphtalène dicarboxylique
 - l'acide 1,5-naphtalène dicarboxylique
 - l'acide 1,6-naphtalène dicarboxylique
 - l'acide 1,7-naphtalène dicarboxylique
 30 - l'acide 2,7-naphtalène dicarboxylique
 - le sel de potassium de l'acide 4-sulfo 1,8-naphtalène dicarboxylique
 - l'acide 1,2,3-naphtalène tricarboxylique
 - l'acide 1,2,3-naphtalène tricarboxylique
 - l'acide 1,2,4-naphtalène tricarboxylique
 35 - l'acide 1,2,5-naphtalène tricarboxylique
 - l'acide 1,2,6-naphtalène tricarboxylique
 - l'acide 1,2,7-naphtalène tricarboxylique
 - l'acide 1,2,8-naphtalène tricarboxylique
 - l'acide 1,3,5-naphtalène tricarboxylique
 40 - l'acide 1,3,7-naphtalène tricarboxylique
 - l'acide 1,3,8-naphtalène tricarboxylique
 - l'acide 1,4,5-naphtalène tricarboxylique
 - l'acide 1,4,6-2-naphtalène tricarboxylique
 - l'acide 2,3,5-naphtalène tricarboxylique
 45 - l'acide 2,3,6-naphtalène tricarboxylique
 - l'acide 1,4,5,8-naphtalène tétracarboxylique (disponible chez ALDRICH)
 - l'acide 1,2,3,4-naphtalène tétracarboxylique
 - l'acide 1,2,5,8-naphtalène tétracarboxylique
 - l'acide 1,3,6,8-naphtalène tétracarboxylique
 50 - l'acide 1,4,5,8-naphtalène tétracarboxylique
 - l'acide 2,3,6,7-naphtalène tétracarboxylique

- (2) les mono- ou polyesters d'acide naphthalène mono- ou polycarboxylique tels que :
- le diméthylester de l'acide 2,3-naphthalène dicarboxylique
 - le diméthylester de l'acide 2,3-naphthalène dicarboxylique
 - le méthylester de l'acide 2-naphthalène carboxylique (disponible chez ALDRICH).


- (3) les mono- ou polyamides d'acide naphthalène mono- ou polycarboxylique tels que le diamide de l'acide 2,3-naphthalène dicarboxylique.

On utilisera plus particulièrement les dérivés d'acide naphthalène dicarboxylique à terminaisons glycols et alcools vendus sous la dénomination commerciale HALLBRITE TQ par la société C.P. HALL.

Les dérivés d'acide naphthalène mono- ou polycarboxylique conformes à l'invention sont généralement présents dans les compositions selon l'invention à une concentration totale comprise entre 0,1 et 20 % en poids environ, et de préférence entre 0,5 et 10 % en poids environ, par rapport au poids total de la composition.

L'acide benzène 1,4-di(3-méthylidène-10-camphosulfonique) et ses différents sels, décrits notamment dans les demandes de brevets FR-A-2528420 et FR-A-2639347, sont des filtres déjà connus en soi (filtres dits à large bande) capables en effet d'absorber les rayons ultraviolets de longueur d'ondes comprises entre 280 et 400 nm, avec des maxima d'absorption compris entre 320 et 400 nm, en particulier aux alentours de 345 nm.

Ces filtres répondent à la formule générale (II) suivante :



dans laquelle D désigne un atome d'hydrogène, un métal alcalin ou encore un radical $\text{NH}(\text{R}_4)_3^+$ dans lequel les radicaux R_4 , qui peuvent être identiques ou différents, désignent un atome d'hydrogène, un radical alkyle ou hydroxyalkyle en $\text{C}_1\text{-C}_4$ ou encore un groupement M^{n+}/n , M^{n+} désignant un cation métallique polyvalent dans lequel n est égal à 2 ou 3 ou 4, M^{n+} désignant de préférence un cation métallique choisi parmi Ca^{2+} , Zn^{2+} , Mg^{2+} , Ba^{2+} , Al^{3+} et Zr^{4+} .

L'acide benzène 1,4-di(3-méthylidène-10-camphosulfonique) et ou l'un de ses différents sels est généralement présent dans les compositions filtrantes selon l'invention à une concentration totale allant de 0,1 à 20 % en poids environ, et de préférence de 0,5 à 10 % en poids environ, par rapport au poids total de la composition.

Les compositions cosmétiques antisolaires selon l'invention peuvent bien entendu contenir un ou plusieurs filtres organiques complémentaires actifs dans l'UVA et/ou l'UVB. Ces filtres complémentaires peuvent être notamment choisis parmi les dérivés cinnamiques ; les dérivés de dibenzoylméthane ; les dérivés salicyliques, les dérivés du camphre ; les dérivés de triazine tels que ceux décrits dans les demandes de brevet US 4367390, EP863145, EP517104, EP570838, EP796851, EP775698, EP878469 et EP 933376 ; les dérivés de la benzophénone ; les dérivés de β,β' -diphénylacrylate, les dérivés de benzimidazole ; les dérivés bis-benzoazole tels que décrits dans les brevets EP-A-0669323 et US 2,463,264 ; les dérivés de l'acide p-aminobenzoïque ; les polymères filtres et silicones filtres tels que ceux décrits notamment dans la demande WO-93/04665.

Comme exemples de filtres solaires complémentaires actifs dans l'UV-A et/ou l'UV-B, on peut citer :

- l'acide p-aminobenzoïque,
- le p-aminobenzoate oxyéthyléné (25mol),
- 5 le p-diméthylaminobenzoate de 2-éthylhexyle,
- le p-aminobenzoate d'éthyle N-oxypropyléné
- le p-aminobenzoate de glycérol,
- le salicylate d'homomenthyle,
- le salicylate de 2-éthylhexyle,
- 10 le salicylate de triéthanolamine,
- le salicylate de 4-isopropylbenzyle,
- le 4-ter-butyl-4'-méthoxy-dibenzoylméthane,
- le 4-isopropyl-dibenzoylméthane,
- le 4-méthoxy cinnamate de 2-éthylhexyle,
- 15 le diisopropyl cinnamate de méthyle,
- le 4-méthoxy cinnamate d'isoamyle,
- le 4-méthoxy cinnamate de diéthanolamine,
- l'anthranilate de menthyle,
- le 2-éthylhexyl-2-cyano-3,3'-diphénylacrylate,
- 20 l'éthyl-2-cyano-3,3'-diphénylacrylate,
- l'acide 2-phényl benzimidazole 5-sulfonique et ses sels,
- le 3-(4'-triméthylammonium)-benzylidène-bornan-2-on-méthylsulfate,
- le 2-hydroxy-4-méthoxybenzophénone,
- le 2-hydroxy-4-méthoxybenzophénone-5-sulfonate,
- 25 le 2,4-dihydroxybenzophénone,
- le 2,2',4,4'-tétrahydroxybenzophénone,
- le 2,2'-dihydroxy-4,4'-diméthoxybenzophénone,
- le 2-hydroxy-4-n-octoxybenzophénone,
- le 2-hydroxy-4-méthoxy-4'-méthylbenzophénone,
- 30 l'acide α -(2-oxoborn-3-ylidène)-tolyl-4-sulfonique et ses sels solubles
- le 3-(4'-sulfo)benzylidène-bornan-2-one et ses sels solubles,
- le 3-(4'-méthylbenzylidène)-d,l-camphre,
- le 3-benzylidène-d,l-camphre,
- l'acide urocanique,
- 35 la 2,4,6-tris-[p-(2'-éthylhexyl-1'-oxycarbonyl)anilino]-1,3,5-triazine,
- la 2-[p-(tertiobutylamido)anilino]-4,6-bis-[(p-(2'-éthylhexyl-1'-oxycarbonyl)anilino)-1,3,5-triazine,
- la 2,4-bis [(4-2-éthyl-hexyloxy)]-2-hydroxy-phenyl]-6-(4-méthoxy-phenyl)-1,3,5-triazine ;
- le polymère de N-(2 et 4)-[(2-oxoborn-3-ylidène)méthyl] benzyl]-acrylamide,
- 40 l'acide 1,4-bis-benzimidazolyl-phénylen-3,3',5,5'-tétrasulfonique et ses sels solubles
- les polyorganosiloxanes à fonction benzalmalonate
- les polyorganosiloxanes à fonction benzotriazole tels que le Drométrizole Trisiloxane

- 45 Les compositions selon l'invention peuvent également contenir des agents de bronzage et/ou de brunissage artificiels de la peau (agents autobronzants), tels que par exemple de la dihydroxyacétone (DHA).

- Les compositions cosmétiques selon l'invention peuvent encore contenir des pigments ou
- 50 bien encore des nanopigments (taille moyenne des particules primaires: généralement entre 5 nm et 100 nm, de préférence entre 10 nm et 50 nm) d'oxydes métalliques enrobés ou non comme par exemple des nanopigments d'oxyde de titane (amorphe ou cristallisé sous forme rutile et/ou anatase), de fer, de zinc, de zirconium ou de cérium qui sont tous des agents photoprotecteurs UV bien connus en soi. Des agents d'enrobage classiques
- 55 sont par ailleurs l'alumine et/ou le stéarate d'aluminium. De tels nanopigments d'oxydes

métalliques, enrobés ou non enrobés, sont en particulier décrits dans les demandes de brevets EP-A-0518772 et EP-A-0518773.

5 Les compositions de l'invention peuvent comprendre en outre des adjuvants cosmétiques classiques notamment choisis parmi les corps gras, les solvants organiques, les épaississants, les adoucissants, les opacifiants, les stabilisants, les émoullients, les agents anti-mousse, les agents hydratants, les parfums, les conservateurs, les polymères, les charges, les séquestrants, les propulseurs, les agents alcalinisants ou acidifiants ou tout
10 autre ingrédient habituellement utilisé en cosmétique, en particulier pour la fabrication de compositions antisolaires sous forme d'émulsions.

15 Les corps gras peuvent être constitués par une huile ou une cire ou leurs mélanges, et ils comprennent également les acides gras, les alcools gras et les esters d'acides gras. Les huiles peuvent être choisies parmi les huiles animales, végétales, minérales ou de synthèse et notamment parmi l'huile de vaseline, l'huile de paraffine, les huiles de silicone, volatiles ou non, les isoparaffines, les polyoléfinés, les huiles fluorées et perfluorées. De même, les cires peuvent être choisies parmi les cires animales, fossiles, végétales, minérales ou de synthèse connues en soi.

20 Parmi les solvants organiques, on peut citer les alcools et polyols inférieurs.

Bien entendu, l'homme de l'art veillera à choisir ce ou ces éventuels composés complémentaires et/ou leurs quantités de manière telle que les propriétés avantageuses, en particulier, le niveau de protection vis à vis des effets induits par les radiations UV-A
25 attachées intrinsèquement aux compositions conformes à l'invention ne soient pas, ou substantiellement pas, altérées par la ou les adjonctions envisagées.

30 Les compositions de l'invention peuvent être préparées selon les techniques bien connues de l'homme de l'art, en particulier celles destinées à la préparation d'émulsions de type huile-dans-eau ou eau-dans-huile.

35 Ces compositions peuvent se présenter en particulier sous forme d'émulsion, simple ou complexe (H/E, E/H, H/E/H ou E/H/E) telle qu'une crème, un lait, un gel ou un gel crème, de poudre, de bâtonnet solide et éventuellement être conditionnée en aérosol et se présenter sous forme de mousse ou de spray.

40 Lorsqu'il s'agit d'une émulsion, la phase aqueuse de celle-ci peut comprendre une dispersion vésiculaire non ionique préparée selon des procédés connus (Bangham, Standish and Watkins. J. Mol. Biol. 13, 238 (1965), FR2315991 et FR2416008).

La composition cosmétique de l'invention peut être utilisée comme composition protectrice de l'épiderme humain ou des cheveux contre les rayons ultraviolets, comme composition
45 antisolaire ou comme produit de maquillage.

50 Lorsque la composition cosmétique selon l'invention est utilisée pour la protection de l'épiderme humain contre les rayons UV, ou comme composition antisolaire, elle peut se présenter sous forme d'une dispersion vésiculaire non ionique, d'une émulsion, en particulier d'une émulsion de type huile-dans-eau, d'une crème, d'un lait, d'un gel, d'un gel crème, d'une suspension, d'une dispersion, d'une poudre, d'un bâtonnet solide, d'une mousse ou d'un spray.

55 Lorsque la composition cosmétique selon l'invention est utilisée pour la protection des cheveux contre les rayons UV, elle peut se présenter sous forme de shampooing, de lotion, de gel, d'émulsion, de dispersion vésiculaire non ionique et constituer par exemple une composition à rincer, à appliquer avant ou après shampooing, avant ou après

coloration ou décoloration, avant, pendant ou après permanente ou défrisage, une lotion ou un gel coiffants ou traitants, une lotion ou un gel pour le brushing ou la mise en plis, une composition de permanente ou de défrisage, de coloration ou décoloration des cheveux.

5 Lorsque la composition est utilisée comme produit de maquillage des cils, des sourcils ou de la peau, tel que crème de traitement de l'épiderme, fond de teint, bâton de rouge à lèvres, fard à paupières, fard à joues, mascara ou ligneur encore appelé "eye liner", elle peut se présenter sous forme solide ou pâteuse, anhydre ou aqueuse, comme des
10 émulsions huile dans eau ou eau dans huile, des dispersions vésiculaires non ioniques ou encore des suspensions.

A titre indicatif, pour les formulations antisolaires conformes à l'invention qui présentent un support de type émulsion huile-dans-eau, la phase aqueuse (comprenant notamment les
15 filtres hydrophiles) représente généralement de 50 à 95% en poids, de préférence de 70 à 90% en poids, par rapport à l'ensemble de la formulation, la phase huileuse (comprenant notamment les filtres lipophiles) de 5 à 50% en poids, de préférence de 10 à 30% en poids, par rapport à l'ensemble de la formulation, et le ou les (co)émulsionnant(s) de 0,5 à 20% en poids, de préférence de 2 à 10% en poids, par rapport à l'ensemble de la
20 formulation.


Un exemple concret, mais nullement limitatif, illustrant l'invention, va maintenant être donné.

COMPOSITION	% en poids
Mélange mono /distearate de glycerol / stéarate de polyéthylène glycol (100 OE) (ARLACEL 165 FL - ICI)	2
Alcool stearylique (LANETTE 18 - HENKEL)	1
Acide stéarique d'huile de palme (STEARINE TP - STEARINERIE DUBOIS)	2.5
Poly dimethylsiloxane (DOW CORNING 200 FLUID - DOW CORNING)	0.5
Benzoate d'alcools en C12/C15 (WITCONOL TN -WITCO)	20
Triethanolamine	0.5
2,4-Bis-[[4-tris(trimethylsiloxy-silylpropyloxy)-2-hydroxy]-phenyl]-6-(4-methoxyphenyl)-1,3,5-triazine	2.5
Glycérine	5
Phosphate d'alcool hexadecylique, sel de potassium (AMPHISOL K - HOFFMAN LAROCHE)	1
Acide polyacrylique (SYNTHALEN K - 3V)	0.3
Hydroxypropyl methyl cellulose (METHOCEL F4M -DOW CHEMICAL)	0.1
Butyl methoxydibenzoyl methane (Parsol 1789 ; GIVAUDAN)	2
Dérivé d'acide naphtalène dicarboxylique à terminaison glycol et alcool (proposé sous la dénomination HALLBRITE TQ par la société CP HALL)	4
Acide benzène 1,4-di(3-méthylidène-10-camphosulfonique) ,Mexoryl SX	1.5
Triethanolamine	qs pH 7
Conservateurs	qs
Eau déminéralisée	qsp 100

REVENDECATIONS

5 1. Composition cosmétique à usage topique, en particulier pour la photoprotection de la peau et/ou des cheveux, caractérisée par le fait qu'elle comprend, dans un support cosmétiquement acceptable notamment de type huile-dans-eau, (a) au moins un dérivé d'acide naphthalène mono- ou polycarboxylique et (b) au moins un système photoprotecteur capable de filtrer les rayons UV contenant au moins l'acide benzène 1,4-di(3-méthylidène-10-camphosulfonique), éventuellement sous forme partiellement ou
10 totalement neutralisée.

2. Composition selon la revendication 1, où le ou les dérivés d'acide naphthalène mono- ou poly-carboxylique sont choisis parmi les composés comprenant au moins un motif répondant à la structure suivante :




dans laquelle :

- 20 A, identiques ou différents, désignent un groupe OR_1 ; un groupe NR_2R_3 ou un cation M
x est un nombre de 1 à 8 ;
y est un nombre de 0 à 7 avec $x+y \leq 8$;
B, identiques ou différents, désignent hydrogène, OR_1 ; un groupe NR_2R_3 ou un groupe
25 $-(C=O)R_1$;
R₁, R₂, R₃, identiques ou différents, désignent hydrogène ; un alkyle en C₁-C₃₀, linéaire ou
ramifié acyclique ou cyclique, éventuellement interrompu par un ou plusieurs
hétéroatomes et éventuellement substitué par un ou plusieurs groupements B différents
d'hydrogène ; un alcényle en C₂-C₃₀, linéaire ou ramifié acyclique ou cyclique,
30 éventuellement interrompu par un ou plusieurs hétéroatomes (tels que O, S, N) et
éventuellement substitué par un ou plusieurs groupements B différents d'hydrogène ; un
groupement aryle, aralkyle ou alkylaryle en C₆-C₃₀, éventuellement substitué par un ou
plusieurs groupements B différents d'hydrogène ; un hétérocycle en C₃-C₁₂,
éventuellement substitué par un ou plusieurs groupements B différents d'hydrogène ; un
halogène (tel que fluor, brome ou chlore) ; un groupe nitrile ; un groupe amino ; un
35 groupe nitro ; un groupe cyano ; un groupe SO_3H ou SO_3M ; un groupement comportant
au moins un atome de silicium ;
M représente un cation de métal alcalin, de métal alcalino-terreux, un groupe ammonium
ou un reste d'amine ou d'alcanolamine quaternisée.
- 40 3. Composition selon la revendication 1 ou 2, où le ou les dérivés d'acide naphthalène
mono- ou poly-carboxylique sont choisis dans le groupe constitué par :
(1) les acides naphthalène mono- ou polycarboxyliques et leurs sels ;
(2) les mono- ou polyesters d'acide naphthalène mono- ou polycarboxylique et leurs sels ;
(3) les mono- ou polyamides d'acide naphthalène mono- ou polycarboxylique et leurs
45 sels ; diamide de l'acide 2,3-naphthalène dicarboxylique et leurs sels.

4. Composition selon l'une quelconque des revendications 1 à 3, où le ou les dérivés d'acide naphthalène mono- ou poly-carboxylique sont des dérivés d'acide naphthalène dicarboxylique à terminaisons glycols et alcools.

5. Composition selon l'une quelconque des revendications 1 à 3, où le ou les dérivés d'acide naphthalène mono- ou poly-carboxylique présents dans les compositions selon l'invention à une concentration totale comprise entre 0,1 et 20 % en poids environ, et de préférence entre 0,5 et 10 % en poids environ, par rapport au poids total de la composition.

6. Composition selon l'une quelconque des revendications 1 à 5, caractérisée par le fait que l'acide benzène 1,4-di(3-méthylidène-10-camphosulfonique) et ses sels répond à la formule (II) suivante :



dans laquelle D désigne un atome d'hydrogène, un métal alcalin ou encore un radical $\text{NH}(\text{R}_4)_3^+$ dans lequel les radicaux R_4 , qui peuvent être identiques ou différents, désignent un atome d'hydrogène, un radical alkyle ou hydroxyalkyle en $\text{C}_1\text{-C}_4$ ou encore un groupement M^{n+}/n , M^{n+} désignant un cation métallique polyvalent dans lequel n est égal à 2 ou 3 ou 4, M^{n+} désignant de préférence un cation métallique choisi parmi Ca^{2+} , Zn^{2+} , Mg^{2+} , Ba^{2+} , Al^{3+} et Zr^{4+} .

7. Composition selon l'une quelconque des 1 à 6, caractérisée par le fait que l'acide benzène 1,4-di(3-méthylidène-10-camphosulfonique), ou l'un de ses sels est généralement présent à une concentration totale comprise entre 0,1 et 20 % en poids environ par rapport au poids total de la composition.

8. Composition selon la revendication 7 où la concentration est comprise entre 0,5 et 10 % en poids environ, par rapport au poids total de la composition

9. Composition selon l'une quelconque des revendications 1 à 8, caractérisée par le fait que ledit support cosmétiquement acceptable se présente sous la forme d'une émulsion de type huile-dans-eau.

10. Composition selon l'une quelconque des revendications 1 à 9, caractérisée par le fait qu'elle comprend en outre un ou plusieurs filtres organiques complémentaires actifs dans l'UV-A et/ou UV-B.

11. Composition selon la revendication 10, caractérisée par le fait que lesdits filtres organiques complémentaires sont choisis parmi les dérivés cinnamiques ; les dérivés de dibenzoylméthane ; les dérivés salicyliques, les dérivés du camphre ; les dérivés de triazine ; les dérivés de la benzophénone ; les dérivés de β,β' -diphénylacrylate, les dérivés de benzimidazole ; les dérivés bis-benzoazolyle ; les dérivés de l'acide p-aminobenzoïque ; les polymères filtres et silicones.

12. Composition selon l'une quelconque des revendications 1 à 11, caractérisée par le fait qu'elle comprend en outre, à titre d'agents photoprotecteurs UV complémentaires, des pigments ou des nanopigments d'oxydes métalliques, enrobés ou non.

13. Composition selon la revendication 12, caractérisée par le fait que lesdits pigments ou nanopigments sont choisis parmi les oxydes de titane, de zinc, de fer, de zirconium, de cérium et leurs mélanges, enrobés ou non.
- 5 14. Composition selon l'une quelconque des revendications 1 à 13, caractérisée par le fait qu'elle comprend en outre au moins un agent de bronzage et/ou de brunissage artificiel de la peau.
- 10 15. Composition selon l'une quelconque des revendications 1 à 14, caractérisée par le fait qu'elle comprend en outre au moins un adjuvant choisi parmi les corps gras, les solvants organiques, les épaississants, les adoucissants, les opacifiants, les stabilisants, les émoullissants, les agents anti-mousse, les agents hydratants, les parfums, les conservateurs, les polymères, les charges, les séquestrants, les propulseurs, les agents alcalinisants ou acidifiants.
- 15 16. Composition selon l'une quelconque des revendications 1 à 15, caractérisée par le fait qu'il s'agit d'une composition protectrice de l'épiderme humain ou d'une composition antisolaire et qu'elle se présente sous forme d'une dispersion vésiculaire non ionique, d'une émulsion, en particulier d'une émulsion de type huile-dans-eau, d'une crème, d'un
- 20 lait, d'un gel, d'un gel crème, d'une suspension, d'une dispersion, d'une poudre, d'un bâtonnet solide, d'une mousse ou d'un spray.
17. Composition selon l'une quelconque des revendications 1 à 15, caractérisée par le fait qu'il s'agit d'une composition de maquillage des cils, des sourcils ou de la peau et qu'elle se présente sous forme solide ou pâteuse, anhydre ou aqueuse, d'une émulsion, d'une suspension ou d'une dispersion.
- 25 18. Composition selon l'une quelconque des revendications 1 à 15, caractérisée par le fait qu'il s'agit d'une composition destinée à la protection des cheveux contre les rayons ultraviolets et qu'elle se présente sous la forme d'un shampoing, d'une lotion, d'un gel, d'une émulsion, d'une dispersion vésiculaire non ionique.
- 30 19. Utilisation de la composition définie selon l'une quelconque des revendications 1 à 18 pour la fabrication de compositions cosmétiques pour la protection de la peau et/ou des cheveux contre le rayonnement ultraviolet, en particulier le rayonnement solaire.
- 35 20. Utilisation d'un dérivé d'acide naphthalène mono- ou polycarboxylique tel que défini dans les revendications précédentes dans la préparation d'une composition cosmétique ou dermatologique photoprotectrice comprenant au moins, comme filtre UV organique, moins l'acide benzène 1,4-di(3-méthylidène-10-camphosulfonique), éventuellement sous forme partiellement ou totalement neutralisée, dans le but d'augmenter son niveau de protection vis à vis des effets induits par les radiations UV-A